

# SCOTTS WEEDCONTROL PF<sub>n</sub>PE

(GRANULARE)

Diserbante selettivo per tappeti erbosi di  
graminacee con nutrienti

Partita n.

## COMPOSIZIONE

2,4 D puro	g 0,80
(sotto forma di sale dimetilamminico g 0.96)	
Dicamba puro	g 0,12
(sotto forma di sale dimetilamminico g 0.14)	
Coformulanti q.b.a	g 100

## Contenuto in nutrienti

CONCIME CE

Concime NPK 22-5-5 contenente urea formaldeide :  
azoto (N) totale: 22%, anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale: 5,0%, ossido  
di potassio (K<sub>2</sub>O) totale: 5,0%

## INDICAZIONI DI PERICOLO

(EUH208) Contiene 2,4-D sale dimetilamminico. Può provocare una  
reazione allergica; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana  
e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

## CONSIGLI DI PRUDENZA

(P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione  
il contenitore o l'etichetta del prodotto; (P102) Tenere fuori dalla  
portata dei bambini; (P103) Leggere l'etichetta prima dell'uso;  
(P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso; (P401)  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; (P501)  
Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione  
nazionale

## SCOTTS FRANCE SAS

21 Chemin de la Sauvegarde  
69130 Ecully (France)  
Tel +33 (0)4 72.86.67.00

## Stabilimento di produzione:

The Scotts Company Ltd – Howdendyke Goole – East Yorkshire  
DN14 7UF (UK)

Reg. Ministero della Sanità n. 10005 del 09/04/1999

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non  
professionali con validità fino al 02-05-2020

Contenuto : 0,5-1 Kg

## Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi dell'associazione di due sostanze attive:

2,4D - 0,80 e Dicamba - 0,1.2% le quali, separatamente,  
provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**2,4D** - Sintomi: irritante per cute e mucose fino ulcerazione delle  
mucose oro-faringea ed esofagea irritante oculare, miosi. Nausea,  
vomito, cefalea ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.  
Danni ai SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie  
periferiche, parestesie, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa  
tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.

Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in  
genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare  
periferico.

**DICAMBA** - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea,  
cianosi, possibile atassia. bradicardia.

Terapia: sintomatica

Avvertenza: Consultare un Centro .Antiveleni.

## Caratteristiche

Scotts Weedcontrol è uno speciale erbicida in granuli pronti all'uso  
per il diserbo di tappeti erbosi costituiti esclusivamente da essenze  
graminacee, posti in aree private, destinati ad uso ornamentale e  
ricreativo quali: viali.

Il prodotto esplica un completo controllo delle infestanti a foglia  
larga come: Achillea (Achillea millefolium), Cerastio dei prati  
(Cerastium sp.), Trifoglio (Trifolium spp.), Trifolium selvatico  
(Medicago lupulina), Radicchiella capillare (Crepis capillaris),  
Costolina (Hypochaeris radicata), Piantaggine (Plantago spp.),  
Pratolina comune (Bellis perennis), Erba ruota (Lamium  
amplexicaule), Veronica (Veronica spp.), Stoppione (Cirsium spp.),  
Ranuncolo (Ranunculus spp.). Brunella (Prunella vulgaris), Dente di  
leone (Taraxacum officinale).

Si consiglia l'applicazione sulle superfici inerbite a taglio corto.  
Evitare di spargere su piante a foglia larga situate al di fuori  
dell'area da trattare

## Dosi ed epoche d'impiego

Scotts Weedcontrol si applica alla dose di 20 g/m<sup>2</sup> (2 Kg/100 m<sup>2</sup>) da  
marzo a settembre, quando le infestanti sono in attiva crescita e su  
prato umido per permettere ai granuli del diserbante di aderire  
meglio alla vegetazione delle infestanti. Per ottenere i migliori  
risultati applicare in primavera o all'inizio dell'estate.

## Effettuare 1 solo trattamento per stagione

## Modalità applicative

Il prodotto si applica a mano o con speciali attrezzature  
spandigranuli. Non tagliare l'erba meno di tre giorni prima  
dell'applicazione ed attendere almeno quattro giorni dopo aver  
applicato il prodotto prima di una nuova falciatura. Non applicare a  
superfici inerbite di nuova realizzazione o nei primi 6 mesi dopo  
l'insediamento.

Mantenere una distanza di tempo di otto settimane dal trattamento  
prima di riseminare/rinfoltire aree o chiazze rimaste scoperte  
dall'erba.

Se entro 48 ore dall'applicazione non piove, irrigare  
abbondantemente l'area sottoposta a trattamento. Nel caso di  
pioggia entro 24 ore può essere necessario ripetere il trattamento  
dopo 4-6 settimane.

## Compatibilità

Il prodotto si usa da solo

## Fitotossicità

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da  
frutto, ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali  
colture.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle  
condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è  
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del  
preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente  
etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del  
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli  
animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di  
vento; Da non versarsi sfuso; Il contenitore completamente  
svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non  
può essere riutilizzato